

Bexidermil Crema

Salicilato de trietanolamina

Composición

Cada gramo contiene:
Salicilato de trietanolamina
(DCI) 100 mg
Excipientes: Ácido sóblico,
propilenglicol, trietanolamina,
alcohol estearílico, alcohol
cetílico, sorbitan
monoestearato; polisorbato 60,
polisorbato 80, miristato de
isopropilo; butilhidroxianisol,
edetato sódico, alcanfor,
mentol y agua desionizada.

Propiedades

Analgésico antiinflamatorio
externo que penetra y se
absorbe rápidamente,
produciendo un alivio inmediato
del dolor.

Indicaciones

Dolor, inflamación y edema
post-traumático en golpes,
contusiones, esguinces.
Inflamación de los ligamentos,
de las articulaciones,
inflamación de los tendones.
Dolores reumatoideos,
musculares y como
complementario de las
enfermedades reumáticas
articulares.

Posología y modo de empleo

Aplíquese sobre la zona
afectada 2 ó 3 veces al día,
siendo aconsejable una
aplicación adicional a la hora
de acostarse.
Debe realizarse un suave
masaje hasta que se absorba.

Contraindicaciones

Antecedentes de
hipersensibilidad a salicilatos.
No utilizar sobre piel lesionada
y mucosas.
No utilizar en niños menores
de 10 años.

Precauciones

Sólo para uso externo. Si el
producto se usa de forma
intensa y continuada, puede
producirse una ligera
descamación de la piel
(peeling), reacción normal de la
misma al uso de salicilatos que
no impide continuar el
tratamiento.
Deberá utilizarse en
aplicaciones locales, no en
grandes zonas. No utilizar
durante el embarazo y
lactancia sin consultar al
médico.

Si aparece enrojecimiento,
agravamiento de los síntomas
o si el dolor persiste durante
más de 7 días, interrumpir el
tratamiento y consultar al
médico.

Evitar el contacto con los ojos.

Advertencias sobre excipientes

Por contener ácido sóblico
como excipiente, en uso tópico
puede causar dermatitis.
Por contener butilhidroxianisol
como excipiente puede ser
irritante de ojos, piel y
mucosas.

Interacciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

Eruptiones en el lugar de
aplicación como reacción de
hipersensibilidad.

Intoxicación y su tratamiento

En la práctica es muy
improbable que en la
administración por vía tópica se
produzcan intoxicaciones.
En caso de ingestión por vía
oral, deberá darse aviso a un
 facultativo para que proceda a

provocar el vómito y/o lavado
gástrico si lo juzga necesario o
bien consultar al Servicio de
Información Toxicológica.
Teléfono 91 562 04 20.

Presentación Bexidermil Crema.

Tubo de 50 g

Otras presentaciones: Bexidermil pulverizador sin gas. Frasco de 200 ml Bexidermil Gel Tubo de 50 g

Sin receta médica.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN
MANTENERSE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

DA4802 - 01 - 0 - Ag

Fabricado por:
Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A.
Martorells (Barcelona)

Laboratorios ISDIN, S.A.
Diagonal, 520
08006 Barcelona

